

## Эндоскопия

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ПОДГОТОВКА
ФГДС (без наркоза)	<p>Бесшлаковая диета за 3-4 дня до процедуры. Исключить: цельнозерновые продукты, черный хлеб, бобовые, свежие фрукты и овощи, зелень, капуста в любом виде, острые приправы, консервы, копчености и соленья, алкоголь, газированные напитки, сладости.</p> <p>Исследование проводится натощак. Последний прием пищи накануне вечером не позже 19:00. Если процедура проводится после 12:00, разрешается утренний сладкий чай до 7:00.</p> <p>Чистка зубов допустима, максимально сплевывая.</p> <p>В день исследования разрешается принимать только препараты, необходимые для жизнедеятельности, т.е. радиоаппараты. Препараты, понижающие артериальное давление и т. д. — запивая небольшим количеством воды не позже 7:00.</p> <p>Накануне исследования не принимать активированный уголь, вазелиновое масло, препараты железа.</p> <p>При насморке, бронхиальной астме иметь при себе назальные капли и спрей.</p>
ФКС (без наркоза)	<p><b>Подготовка аналогично ФГДС (без наркоза)</b> +</p> <p>Накануне вечером, а также утром в день исследования очистить кишечник с помощью препаратов «Фортранс» или «Мовипреп», согласно инструкции.</p>
ФГДС под наркозом	<p><b>Подготовка аналогично ФГДС (без наркоза)</b> +</p> <p>Перед исследованием сдаются обязательные анализы для наркоза: снятие и расшифровка ЭКГ, клинический анализ крови, Профиль № 103: Коагулограмма (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время.)</p>

ФКС под наркозом	<p><b>Подготовка аналогично ФГДС (без наркоза)</b></p> <p>+</p> <p>Перед исследованием сдаются обязательные анализы для наркоза: снятие и расшифровка ЭКГ, клинический анализ крови, Профиль № 103: Коагулограмма (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время.)</p> <p>Накануне вечером, а также утром в день исследования очистить кишечник с помощью препаратов «Фортранс» или «Мовипреп», согласно инструкции.</p>
------------------	---

## Функциональная диагностика

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ПОДГОТОВКА
Суточное мониторирование по Холтеру	<p>Рекомендована свободная форма одежды во время исследования (не синтетика). Перед исследованием принять душ.</p> <p>Мужчинам, имеющим волосяной покров, необходимо выбрить грудь от ключиц до нижних ребер.</p>

## УЗИ взрослых

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ПОДГОТОВКА
<b>МАЛЫЙ ТАЗ (ЖЕНЩИНЫ)</b>	
УЗИ органов малого таза (Ж) трансабдоминально+трансвагинально	<p>Исследование двумя методами, проводится с наполненным мочевым пузырем.</p> <p>Рекомендовано на 5-10 день месячного цикла (если срочно, то день цикла не важен).</p>
УЗИ органов малого таза – наличие беременности, срок (Ж)	Исследование проводится строго до 11 недель беременности
УЗИ малого таза (контроль фолликулогенеза)	
УЗИ наблюдение за яйцеклеткой в течение 1 цикла	
Скрининг 3 триместр +цервикометрия	Исследование проводится строго в 3 триместр беременности
УЗИ органов малого таза (Ж) трансабдоминально	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным

	мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа). Рекомендовано на 5-10 день месячного цикла (если срочно, то день цикла не важен).
УЗИ органов малого таза (Ж) трансвагинально	Исследование трансвагинальным датчиком, проводится с пустым мочевым пузырем. Рекомендовано на 5-10 день месячного цикла (если срочно, то день цикла не важен).
<b>МАЛЫЙ ТАЗ (МУЖЧИНЫ)</b>	
УЗИ предстательной железы трансабдоминально и трансректально	Исследование двумя методами, проводится с наполненным мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа). Перед исследованием необходимо очистить прямую кишку (микрোকлизма «Микролакс» накануне вечером)
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа).
УЗИ предстательной железы	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа).
УЗИ органов мошонки	нет
<b>БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ</b>	
УЗИ брюшной полости (комплексное)	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до исследования. Не курить. Пить можно только воду.
УЗИ брюшной полости с <b>функциональной пробой</b> (комплексное)	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до исследования. Не курить. Взять с собой 2 вареных яйца или хофитол.
УЗИ брюшной полости(комплексное)+почки	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до исследования. Не курить. Пить можно только воду.
УЗИ желчного пузыря с <b>определением функции</b>	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до исследования. Не курить. Пить можно только воду.
УЗИ печени и желчного пузыря	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до

	исследования. Не курить. Пить можно только воду.
УЗИ селезенки	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до исследования. Не курить. Пить можно только воду.
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до исследования. Не курить. Пить можно только воду.
УЗИ поджелудочной железы	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 6-8 часов до исследования. Не курить. Пить можно только воду.
<b>УЗИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ</b>	
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа).
УЗИ мочевого пузыря	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа).
УЗИ почек и надпочечников	нет
УЗИ почек и мочевого пузыря	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа).
УЗИ почек	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ почек с доплерографией сосудов	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ артерий почек	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи за 8-12 часов до исследования. Не курить. Пить можно только воду.
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем (за час до УЗИ выпить 1 литр воды без газа).
<b>ДРУГИЕ ВИДЫ УЗИ</b>	
УЗИ щитовидной железы	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ позвоночника (все отделы)	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ

УЗИ плевральных синусов	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ слюнных желез	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ мягких тканей	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ лимфатических узлов (1 группа)	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ суставов	
УЗИ молочных желез	Исследование рекомендовано на 5-10 день месячного цикла (если срочно, то день цикла не важен)
УЗИ содержимого грыжевого мешка	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ Артерий и вен нижних конечностей	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ вен нижних конечностей	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ Артерий и вен верхних конечностей	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ вен верхних конечностей	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ нижней полой вены	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
БЦА шея	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
БЦА голова	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
БЦА шея и голова	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ

## УЗИ детей

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ПОДГОТОВКА
УЗИ шеи	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ сосудов шеи и головы	Исследование проводится детям строго с 3 лет.
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ мочевого пузыря и почек	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем.
УЗИ вилочковой железы	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ органов брюшной полости (комплекс)	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи: грудным детям — за 3 часа до исследования, до 7 лет — за 4-5 часов, с 7 лет и старше — за 6-8 часов. Пить можно только воду.
УЗИ мягких тканей	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ

УЗИ парных суставов	Только коленные (0 до 18) и до 3 лет тазобедренные
УЗИ грудных молочных желез мальчикам/девочкам	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ щитовидной железы	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ печени	Исследование проводится натощак. Последний прием пищи: грудным детям — за 3 часа до исследования, до 7 лет — за 4-5 часов, с 7 лет и старше — за 6-8 часов. Пить можно только воду.
УЗИ почек	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
Нейросонография	Исследование проводится детям до 1,5 лет.
УЗИ органов мошонки	ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТ
УЗИ малого таза ТА (М и Д)	Исследование трансабдоминальным датчиком, проводится с наполненным мочевым пузырем.
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 видов УЗИ (нейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки)</li> </ul>	